

Couverture :

Tarn (54%), Aveyron (38%), Tarn-et-Garonne (7%), Haute-Garonne (1%)

Commune concernée :

Montredon-Labessonnié



Ce site Natura 2000 est divisé en 4 commissions territoriales :

1. Vallée de l'Aveyron
2. Vallées de l'Agoût et du Gijou
3. Vallée du Viaur
4. Vallée du Tarn aval

Chaque sous-territoire rédige son propre document d'objectifs DOCOB et dispose d'un comité de pilotage propre.


Commentaire général :

Le site couvre les vallées de principales rivières affluentes du Tarn dans les départements du Tarn et de l'Aveyron.

Il se compose de :

- 3 vallées encaissées sur granit et schistes (**Haute-vallée de l'Agoût, vallée du Gijou** et vallée du Viaur). Ces 3 parties comportent de nombreux affleurements rocheux, des ripisylves, boisements (chênaies avec hêtres, châtaigneraies et reboisements artificiels en résineux), landes, prairies et cultures.
- du cours linéaire de la basse vallée de l'Agoût et du Tarn à l'aval de sa confluence avec l'Agoût
- du cours linéaire de l'Aveyron
- du cours linéaire du Viaur

Répartition des types de milieux



- Forêts caducifoliées*
- Forêts artificielles en monoculture (ex : plantations de peupliers ou d'arbres exotiques)
- Eaux douces intérieures (eaux stagnantes, eaux courantes)
- Landes, Broussailles, Recrus*, Maquis et garrigues

Le remplacement des habitats forestiers d'origine par des résineux exotiques participe à la vulnérabilité du site.



Le site présente un intérêt majeur pour la **Loutre d'Europe** (*lutra lutra*) (photo : *Patrick Bouchard*) et la **Moule perlière** (*Margaritifera Margaritifera*) (photo : *Natural England*) présents dans la haute vallée de l'Agoût et du Gijou.



Ci-dessous : Evolution de la population française de **Loutre d'Europe** (d'après *Rosoux et Bouchardy*).



Sur la zone du Viaur, on retrouve la station la plus orientale de France du **Chêne Tauzin**, présent des Pyrénées Atlantiques jusqu'en Charente. Photo : *jack ma*.

Présence de très beaux vieux vergers traditionnels de **châtaigniers** dans la vallée du Viaur. Photo : *cassiopée2010*



Des frayères potentielles de **Saumons atlantiques** (*Salmo Salar*) ont été notées dans la vallée du Tarn et surtout dans la vallée de l'Aveyron. Des restaurations sont en cours.

